第4講座 関数

P. 34

1 <解答例>

(1) $\frac{3}{2} \leq y \leq 4$ (2) -2 (3) $y = \frac{10}{x}$

(4) ア 12 イ 6 (5) ア 500 イ 4250 (6) $y = \frac{6}{x}$

(7) $y = 3$ (8) ① $a = 12$ ② $\frac{3}{4} \leq m \leq 3$

(9) ア, イ, エ (10) $y = \frac{6}{5}$

<考え方・解き方>

(1) $y = \frac{a}{x}$ に $x = 6$, $y = 2$ を代入

すると, $2 = \frac{a}{6}$, $a = 12$,

よって, 比例定数は12なので, 図のようにグラフに表すと, $x = 3$ のとき $y = 4$,

$x = 8$ のとき $y = \frac{3}{2}$ となり,

y の変域は $\frac{3}{2} \leq y \leq 4$ である。

(2) 2点 A, B のそれぞれの座標は (2, 8), (4, 4) となるので, この2点を通る直線の傾きは,

$$\text{傾き} = \frac{4-8}{4-2}$$

$$= -\frac{4}{2}$$

$$= -2$$

(3) $y = \frac{a}{x}$ に $x = 2$, $x = 5$ をそれぞれ代入すると,

$$x = 2 \text{ のとき, } y = \frac{a}{2} \cdots \text{①}$$

$$x = 5 \text{ のとき, } y = \frac{a}{5} \cdots \text{②}$$

$$\text{①} = \text{②} + 3 \text{ より,}$$

$$\frac{a}{2} = \frac{a}{5} + 3$$

$$5a = 2a + 30$$

$$a = 10$$

$$\text{よって, } y = \frac{10}{x}$$

(4) ① に $x = 3$ を代入すると,

$$y = \frac{4}{3} \times 3$$

$$y = 4$$

よって, ①, ②の交点の座標は (3, 4) で, ②のグラフはこの点を通るので, $a = xy$ より, $a = 3 \times 4 = 12$. イに入る数を求めるには, $xy = 12$ より, 積が12となる x と y の自然数の組み合わせを考える。

$(x, y) = (1, 12)(2, 6)(3, 4)(4, 3)(6, 2)(12, 1)$ 以上の6組である。

(5) 2人の出発してからの時間を x 分, 走った距離を ym とすると, 一郎のグラフを表す式は, 1000mを4分で走っているのて,

$$1000 \div 4 = 250 \text{ より, } y = 250x$$

同様にして, 大輔のグラフを表す式は,

$$800 \div 4 = 200 \text{ より, } y = 200x$$

$x = 10$ をそれぞれに代入して,

$$\text{一郎: } y = 250 \times 10 = 2500$$

$$\text{大輔: } y = 200 \times 10 = 2000 \text{ より,}$$

$$2500 - 2000 = 500 \rightarrow \text{ア}$$

スタート地点から $\square$ m 地点を一郎が t 分後に通過したとすると, 大輔は $t + 4\frac{1}{4}$ 分後に通過するので,

$$250t = 200 \left(t + 4\frac{1}{4} \right) \text{ より,}$$

$$t = 17$$

よって, $250 \times 17 = 4250 \rightarrow \text{イ}$

(6) 反比例の式を $y = \frac{a}{x}$ とすると,

$$\text{点 A の } y \text{ 座標} = \frac{a}{3}$$

$$\text{点 B の } y \text{ 座標} = \frac{a}{-1} = -a$$

この差が8だから,

$$\frac{a}{3} - (-a) = 8$$

$$a = 6$$

よって, 求める式は $y = \frac{6}{x}$ である。

(7) 反比例なので, $xy = \text{一定}$ だから,

$$2 \times 9 = 6 \times y$$

$$6y = 18$$

$$y = 3$$

(8) ① $y = \frac{a}{x}$ より $a = xy$ これに (2, 6) を代入して,

$$a = 2 \times 6 = 12$$

② $y = mx$ に (2, 6) を代入して,

$$m = 3 \cdots \text{i}$$

①より, $12 = xy$ に $x = 4$ を代入して,

$$12 = 4y$$

$$y = 3$$

よって, B(4, 3) なので, これを $y = mx$ に代入して,

$$3 = 4m$$

$$m = \frac{3}{4} \cdots \text{ii}$$

したがって, i, iiより, $\frac{3}{4} \leq m \leq 3$

(9) x の値が決まると, それにともなって y の値も1つに決まるのが関数であり, ウ, オはこの定義を満たしていない。

(10) 反比例なので, $xy = \text{一定}$ だから,

$$2 \times 3 = 5 \times y$$

$$5y = 6$$

$$y = \frac{6}{5}$$

P. 37

2 <解答例>

(1) ①時速30km ②24分後

(2) ①午前10時26分40秒 ② $10.8 \leq a < 13.5$

(3) ①2420円 ②880円

- (4) ①5080円 ② $1200 < a < 1320$
 (5) ①妹：毎秒1 m, 姉：毎秒1.25 m
 ②30秒後
 (6) ①60秒後 ② $a = 5.5, b = 0.8$
 (7) ①毎分220m ②22分40秒後
 (8) ① $a = 3$ ②15分後 ③ $1 \leq b < 4$
 (9) ①ウ ②2
 (10) ①カ ②-1 ③-4, 2

<考え方・解き方>

- (1)①グラフより、8 km を16分($\frac{16}{60}$ 時間)で進むことが

分かるので、

$$8 \div \frac{16}{60} = 30 \text{ (時速30km)}$$

- ②大輔さんの式は、速さが時速15kmなので、傾きは

$$\frac{15}{60} = \frac{1}{4}$$

よって、 $y = \frac{1}{4}x \cdots i$

バスの式は2点(20, 8), (36, 0)を通るので、傾きは、

$$\frac{0-8}{36-20} = -\frac{1}{2}$$

求める式を $y = -\frac{1}{2}x + b$ とおき、(36, 0)を代入して、 $b = 18$

よって、 $y = -\frac{1}{2}x + 18 \cdots ii$

i, iiを連立方程式で解いて、 $(x, y) = (24, 6)$ したがって、24(分後)

- (2)①バスの直線の式はグラフより、(20, 9), (35, 0)の2点を通ることがわかるので、

$$y = -\frac{3}{5}x + 21 \cdots i$$

大輔さんの式は、時速18kmより、傾きは、 $\frac{18}{60} =$

$\frac{3}{10}$ 、また、グラフより(10, 0)を通ることがわか

るので、求める式を $y = \frac{3}{10}x + b$ とおき、これに(10, 0)を代入して、

$$y = \frac{3}{10}x - 3 \cdots ii$$

i, iiを連立方程式で解いて、

$$x = \frac{80}{3} \left(26\frac{2}{3} \right)$$

$\frac{80}{3} \left(26\frac{2}{3} \right)$ 分は26分40秒のことなので、

午前10時26分40秒

- ②上図より、条件を満たすには、50分から60分の間に大輔さんがスタジアムに到着すればよいことがわかる。到着するのが50分のとき、 a の値は、

$$9 \div \frac{50-10}{60} = \frac{27}{2} (13.5) \cdots i$$

到着するのが60分のとき、 a の値は、

$$9 \div \frac{60-10}{60} = \frac{54}{5} (10.8) \cdots ii$$

i, iiより、 $10.8 \leq a < 13.5$

- (3)①1か月間の水の使用量が 23m^3 のときの水道料金は、 $400 + 40 \times 10 + 120 \times 10 + 140 \times 3 = 2420$ 円となる。

- ②大輔さんが住んでいる市の1か月当たりの水道料金の基本料金を x 円とする。このとき、大輔さんが住んでいる市で1か月間の水の使用量が 28m^3 のときの水道料金は、 $x + 80 \times 28 = x + 2240$ 円となる。また、美咲さんが住んでいる市で1か月間の水の使用量が 28m^3 のときの水道料金は、 $400 + 40 \times 10 + 120 \times 10 + 140 \times 8 = 3120$ 円となる。よって、 $x + 2240 = 3120$ より、

$$x = 880$$

したがって、大輔さんが住んでいる市の1か月当たりの水道料金の基本料金は880円となる。

- (4)①1か月間の水の使用量は $x\text{m}^3$ なので、ヒバリ市の水道料金は、 $620 + 140 \times 10 + 170 \times (x - 20)$ (円)となる。

また、リンドウ市の水道料金は、 $900 + 110 \times x$ (円)となる。

それぞれの市の水道料金が等しくなるので、

$$620 + 140 \times 10 + 170 \times (x - 20) = 900 + 110 \times x$$

これを解いて、 $x = 38 (\text{m}^3)$ となる。

$x = 38$ をリンドウ市の水道料金を表す式に代入すると、

$$900 + 110 \times 38 = 5080 \text{ (円) となる。}$$

- ②基本料金 a 円、使用量ごとの料金を 1m^3 につき80円、1か月間の水の使用量は $x\text{m}^3$ なので、水道料金は $a + 80x$ (円)と表せる。よって、<条件>の1つ目の、水の使用量が 10m^3 のとき、 $x = 10$ を代入して、 $a + 80 \times 10 = a + 800$ (円)と表せる。このときのヒバリ市の水道料金は $620 + 0 = 620$ (円)。リンドウ市の水道料金は、 $900 + 110 \times 10 = 2000$ (円)。よって、水道料金はリンドウ市の水道料金2000円より高くなるように設定するので、

$$a + 800 = 2000 \text{ より、}$$

$$a = 1200$$

よって、基本料金を1200円より高くする。

また、<条件>の2つ目の、水の使用量が 30m^3 のとき、 $x = 30$ を代入して、 $a + 80 \times 30 = a + 2400$

(円)と表せる。このときのヒバリ市の水道料金は $620+140\times 10+170\times 10=3720$ (円)。リンドウ市の水道料金は、 $900+110\times 30=4200$ (円)。よって、水道料金はヒバリ市の水道料金3720円より安くなるように設定するので、

$$a+2400=3720 \text{ より、}$$

$$a=1320$$

よって、基本料金を1320円より安くする。

したがって、 $1200 < a < 1320$ となる。

- (5) ①グラフより、妹は1往復50mを50秒で泳いでいる。よって、速さは $50 \div 50 = 1$ (m/秒)となる。姉は、1往復50mを40秒で泳いでいる。よって、速さは $50 \div 40 = 1.25$ (m/秒)となる。

- ②妹の式は、(25, 25), (50, 0)を通るので、

$$\text{傾きは } \frac{0-25}{50-25} = -\frac{25}{25} = -1$$

求める式を $y = -x + b$ とおき、(50, 0)を代入して、 $b = 50$

$$\text{よって、 } y = -x + 50 \cdots \text{i}$$

姉の式は、(14, 0), (34, 25)を通るので、

$$\text{傾きは } \frac{25-0}{34-14} = \frac{25}{20} = \frac{5}{4}$$

求める式を $y = \frac{5}{4}x + b$ とおき、(14, 0)を代入して、

$$b = -\frac{35}{2}$$

$$\text{よって、 } y = \frac{5}{4}x - \frac{35}{2} \cdots \text{ii}$$

i, iiを連立方程式で解いて、

$$(x, y) = (30, 20)$$

したがって、30(秒後)となる。

- (6) ①2回目にすれちがった時間は、姉と妹の直線の式をそれぞれ求め、その交点の x 座標となる。よって、姉の $48 \leq x \leq 68$ での式は、(48, 25), (68, 0)を通る直線より、

$$y = -\frac{5}{4}x + 85 \cdots \text{i}$$

妹の $50 \leq x \leq 75$ での式は、(50, 0), (75, 25)を通る直線より、

$$y = x - 50 \cdots \text{ii}$$

i, iiを連立方程式で解いて、

$$(x, y) = (60, 10)$$

したがって、60(秒後)となる。

②

次の日、姉がプールを泳いで2往復したグラフは、上図のようになる。

$x = 58$ を $y = x - 50$ に代入して、 $y = 58 - 50 = 8$ とな

る。よって、姉の平泳ぎの速さは $68 - 58 = 10$ 秒で8m泳ぐので、 $b = 8 \div 10 = 0.8$ (m/秒)となる。

また、姉が平泳ぎで1往復するのにかかる時間は、 $50 \div 0.8 = 62.5$ (秒)より、姉は、妹がスタートしてから $a = 68 - 62.5 = 5.5$ (秒後)にスタートしている。

- (7) ①グラフより、1760mを8分で走るので、

$$1760 \div 8 = 220 \text{ (m/分)}$$

- ②直樹さんの式は、(12, 2400), (27, 4800)を通るので、

$$y = 160x + 480 \cdots \text{i}$$

航平さんの式は、(4, 0), (12, 1760)を通るので、

$$y = 220x - 880 \cdots \text{ii}$$

i, iiを連立方程式で解いて、

$$x = \frac{68}{3} \left(22\frac{2}{3} \right)$$

よって、22分40秒後となる。

- (8) ①健太さんが1周を走り終えたのは、スタートして12分後。このとき、航平さんは、

$$2400 - 240 = 2160 \text{ m地点を走っている。}$$

よって、 $(2160 \div 240 =)$ 9分でたどりつくので、

$$a = 12 - 9 = 3$$

- ②直樹さんの式は、(12, 2400), (27, 4800)を通るので、

$$y = 160x + 480 \cdots \text{i}$$

航平さんの式は、(3, 0), (12, 2160)を通るので、

$$y = 240x - 720 \cdots \text{ii}$$

i, iiを連立方程式で解いて、

$$x = 15$$

よって、15分後となる。

- ③航平さんが直樹さんに並んでから2分後の $x = 17$ をiiに代入すると、 $y = 3360$

$$y = 3360 \text{ を i の式に代入すると、 } x = 18$$

このときに、航平さんが立ち止まるとすると、

$$b = 18 - 17 = 1$$

航平さんが、そのまま2週目を走り終えたとすると、iiの式に、 $y = 4800$ を代入して、 $x = 23$ 分後。このとき、直樹さんを $27 - 23 = 4$ 分待つことになる。

よって、 $1 \leq b < 4$

- (9) ①グラフを y 軸の正の方向に平行移動するためには、切片を大きくするとよい。よって、ウとなる。

- ② $y = 3x + 1$ と $y = -x + 3$ を連立方程式で解いて、

$$(x, y) = \left(\frac{1}{2}, \frac{5}{2} \right)$$

これを $y = x + b$ に代入して、

$$\frac{5}{2} = \frac{1}{2} + b$$

$$b = 2$$

- (10) ①二元一次方程式 $ax + by + c = 0$ を、 y を x を使っ

た式で表すと、 $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ となる。グラフを y

軸の正の方向に平行移動するには、切片を大きく

するとよい。このとき、切片 $-\frac{c}{b}$ の符号が負であ

ることに注意する。また、 b の値を小さくしても切片は大きくなるが、その場合、傾きも変わってしまうため、平行移動にならない。よって、カとなる。

② $2x - y - 1 = 0$ と $x + y - 3 = 0$ を連立方程式で解いて、

$$(x, y) = \left(\frac{4}{3}, \frac{5}{3}\right)$$

これを $ax + 2y - 2 = 0$ に代入して、

$$\frac{4}{3}a + \frac{10}{3} - 2 = 0$$

$$a = -1$$

③ それぞれの式を y を x を使った式で表すと、

$$y = 2x - 1 \cdots \textcircled{1}$$

$$y = -x + 3 \cdots \textcircled{2}$$

$$y = -\frac{a}{2}x + 1 \cdots \textcircled{3}$$

2つの直線が平行となると、傾きが等しいので、

(i) ①と③の傾きが等しいとき、

$$-\frac{a}{2} = 2$$

$$a = -4$$

(ii) ②と③の傾きが等しいとき、

$$-\frac{a}{2} = -1$$

$$a = 2$$

(i), (ii)より、 $a = -4, 2$

P. 46

3 <解答例>

(1) 6秒後

(2) ①

② $x = 2, 5$

<考え方・解き方>

(1) t 秒後に出会うとすると、

$$(A \sim B \sim P) + (D \sim C \sim Q)$$

$$= 18 \text{である。}$$

ここで、

$$(A \sim B \sim P) = t$$

$$(D \sim C \sim Q) = 2t$$

となるから、

$$t + 2t = 18$$

$$t = 6$$

よって、6秒後に出会う。

(2) ①右図のように、点PがAB上にあるとき、

$\triangle APQ$ の底辺 $AP = x$ (cm)、

高さ $QH = 6$ (cm)だから、

$$\triangle APQ = \frac{1}{2} \times AP \times QH$$

$$y = \frac{1}{2} \times x \times 6$$

$$y = 3x$$

となるので、 $0 \leq x \leq 4$ の変域で、この式のグラフをかく。

②右図のように、点P, Qが辺BC上にあるとき、

$\triangle APQ$ は底辺がPQ、高さが辺ABである。ここで、

$$A \sim B \sim C \sim D = 4 + 6 + 8 = 18,$$

$$A \sim B \sim P = x,$$

$$D \sim C \sim Q = 2x \text{なので、}$$

$$PQ = 18 - x - 2x$$

$$= -3x + 18$$

となる。よって、

点P, Qが辺BC上にあるときの x, y の関係式は次のようになる。

$$\triangle APQ = \frac{1}{2} \times PQ \times AB$$

$$y = \frac{1}{2} \times (-3x + 18) \times 4$$

$$y = -6x + 36$$

①, ②より、 x, y の関係式をグラフに

表すと、右図のようになるので、 $y = 6$ を $y = 3x$ と $y = -6x + 36$ にそれぞれ代入して、 x の値を求めればよい。

$y = 3x$ に代入して、

$$6 = 3x$$

$$x = 2$$

$y = -6x + 36$ に代入して、

$$6 = -6x + 36$$

$$x = 5$$

P. 46

4 <解答例>

(1) $a = \frac{3}{2}$ (2) $a = \frac{1}{4}$ (3) $y = \frac{16}{3}$

(4) $0 \leq y \leq 12$ (5) $a = \frac{4}{5}$

<考え方・解き方>

(1)直線PQと y 軸の交点をRとする。P(-2, 4a), R

(0, 3), Q(1, a)であるから、

$$\text{PRの傾き} = \frac{3-4a}{0-(-2)} \dots \text{①}$$

$$\text{RQの傾き} = \frac{a-3}{1-0} \dots \text{②}$$

PRの傾き=RQの傾きであるから、①、②より、

$$\frac{3-4a}{0-(-2)} = \frac{a-3}{1-0}$$

$$\frac{3-4a}{2} = a-3$$

$$3-4a=2a-6$$

$$-6a=-9$$

$$a=\frac{3}{2}$$

(2) $y=ax^2$ で、 x が -1 から 3 まで増加するときの変化の割合は、 $y=\frac{1}{2}x+b$ の傾きと等しくなるので、

$$\frac{9a-a}{3-(-1)} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{8a}{4} = \frac{1}{2}$$

$$a = \frac{1}{4}$$

(3) $y=ax^2$ に $x=-3$ 、 $y=12$ を代入して、

$$12=9a$$

$$a = \frac{4}{3}$$

$y=\frac{4}{3}x^2$ に $x=2$ を代入して、

$$y = \frac{4}{3} \times 4$$

$$y = \frac{16}{3}$$

(4) $\frac{1}{3} > 0$ だから上に開くグラフなので、

$x=0$ のとき、 y の最小値 $=0$

$x=6$ のとき、 y の最大値 $=\frac{1}{3} \times 6^2 = 12$

よって、 y の変域は $0 \leq y \leq 12$

(5) $y=ax^2$ で x が m から n まで増加するときの変化の割合は $a(m+n)$ で表されるので、

$$a(1+4) = 4$$

$$a = \frac{4}{5}$$

P. 47

⑤<解答例>

(1) 8 (2) $-\frac{2}{3}$ (3) $y = -\frac{2}{3}x + 4$

(4) 7個

<考え方・解き方>

(1) $y=\frac{2}{9}x^2$ に $x=-6$ を代入して、

$$y = \frac{2}{9} \times (-6)^2$$

$$= 8$$

(2) A(-6, 8), B(3, 2)だから、

$$\begin{aligned} \text{変化の割合} &= \frac{2-8}{3-(-6)} \\ &= -\frac{2}{3} \end{aligned}$$

(3)(2)より、A(-6, 8), B(3, 2)を通る直線の式を求める。

(4)右図で、

$x=1$ のとき

$$y = \frac{10}{3} \left(\frac{3}{3} \right)$$

だから、

$0 < y < 3\frac{1}{3}$ の範囲

に、整数は3個ある。

同様に、 $x=2$ のとき $y = \frac{8}{3} \left(2\frac{2}{3} \right)$ だから 2個。

$x=3$ のとき $y=2$ だから 1個。(2は含まない)

$x=4$ のとき $y = \frac{4}{3} \left(1\frac{1}{3} \right)$ だから 1個。

$x=5$ のとき $y = \frac{2}{3}$ だから 0個。

よって、 $3+2+1+1=7$ (個)

P. 47

⑥<解答例>

(1) $a = \frac{3}{4}$, $b = 48$ (2) $y = \frac{1}{2}x + 2$

(3) ① $\frac{3}{2}t^2 - 4 - t$ ② $\left(\frac{8}{3}, \frac{16}{3} \right)$

<考え方・解き方>

(1) A(4, 16a),

B(2, 4a)なので、

$$\frac{16a-4a}{4-2} = \frac{9}{2}$$

$$\frac{12a}{2} = \frac{9}{2}$$

$$a = \frac{3}{4}$$

よって、A(4, 12)

なので、①の式に

代入して、

$$12 = \frac{b}{4}$$

$$b = 48$$

(2) B(2, 3), C(8, 6)を通る直線の式を求める。

(3) ① P($\frac{3}{4}t^2$)とおけるので、点Qのy座標は $\frac{3}{4}t^2$ と

なる。 $y = \frac{3}{4}t^2$ を(2)の式 $y = \frac{1}{2}x + 2$ に代入して、

$$\frac{3}{4}t^2 = \frac{1}{2}x + 2$$

$$\frac{1}{2}x = \frac{3}{4}t^2 - 2$$

$$x = \frac{3}{2}t^2 - 4$$

よって、点Qのx座標は $\frac{3}{2}t^2 - 4$ である。

よって、

$$\begin{aligned} PQ &= \left(\frac{3}{2}t^2 - 4\right) - t \\ &= \frac{3}{2}t^2 - t - 4 \end{aligned}$$

② $PR=t$ なので $PQ:PR=3:2$ より、

$$\begin{aligned} \left(\frac{3}{2}t^2 - t - 4\right) : t &= 3 : 2 \\ 3t^2 - 2t - 8 &= 3t \\ 3t^2 - 5t - 8 &= 0 \\ t &= \frac{5 \pm \sqrt{25 + 96}}{6} \\ &= \frac{5 \pm 11}{6} \\ t &= -1, \frac{8}{3} \\ 2 < t < 4 \text{ より、} & t = \frac{8}{3} \end{aligned}$$

P. 48

7 < 解答例 >

- (1) $a = \frac{3}{4}$ (2) $y = 2x + 4$
 (3) -2 (4) $(2, 3)$

<考え方・解き方>

- (1) $y = ax^2$ に $(4, 12)$ を代入して、 $a = \frac{3}{4}$
 (2) 切片が 4 なので、求める式を $y = mx + 4$ とおき、これに $(4, 12)$ を代入して、
 $12 = 4m + 4$
 $m = 2$
 よって、 $y = 2x + 4$
 (3) (2) より、 $y = 2x + 4$ に $y = 0$ を代入して、
 $0 = 2x + 4$
 $x = -2$
 (4) 点 P の y 座標を h とおく。

$\triangle BPQ = \triangle ABO$ より、
 $8 \times h \times \frac{1}{2} = 2 \times 12 \times \frac{1}{2}$
 $h = 3$

$y = \frac{3}{4}x^2$ に $y = 3$ を代入
 $3 = \frac{3}{4}x^2$
 $x^2 = 4$
 $x = \pm 2$
 $x > 0$ なので、 $x = 2$
 よって、 $P(2, 3)$ と分かる。

P. 48

8 < 解答例 >

- (1) $a = \frac{1}{3}$ (2) $y = -\frac{1}{3}x + 2$
 (3) ① 14 ② $\frac{5}{11}$ 倍

<考え方・解き方>

- (1) $y = x + 6$ に $x = -3$ を代入して、
 $y = -3 + 6$

$= 3$

よって、 $A(-3, 3)$ 。これを $y = ax^2$ に代入して、

$$a = \frac{1}{3}$$

(2)(1) より、 $y = \frac{1}{3}x^2$ に $x = 2$ を代入して、

$$y = \frac{4}{3}$$

よって、 $C(2, \frac{4}{3})$ 。よって、 $A(-3, 3)$ 、 $C(2, \frac{4}{3})$

を通る直線の式を求めるとよい。

(3) ① $\triangle ACP = \triangle ACB$ になるには、 $AC \parallel PB$ であればよい。点 B の y 座標は、A の y 座標より 9 だけ大きいので、

$$\begin{aligned} 3 + 9 &= 12 \\ y &= 12 \text{ を ④ の} \\ y &= x + 6 \text{ に代入して、} \\ 12 &= x + 6 \\ x &= 6 \end{aligned}$$

よって、 $B(6, 12)$

$AC \parallel PB$ より、
 求める式を

$$y = -\frac{1}{3}x + b$$

とおき、

$B(6, 12)$ を代入して、

$$12 = -\frac{1}{3} \times 6 + b$$

$$b = 14$$

点 P は直線 PB の切片なので点 P の y 座標は 14 である。

(3) ② 線分 AB と線分 PC の交点を Q とする。 $AC \parallel PB$ より、 $\triangle AQC \sim \triangle BQP$ となる。

ここで、相似比 $AC:BP$ は、A と C、P と B の x 座標の差として考えるので、

$$AC:BP = |2 - (-3)| : (6 - 0) = 5:6$$

これより、

$$AB:AQ = (5+6) : 5 = 11:5$$

左図より、 $\triangle ACB$ と $\triangle ACP$ の重なっている部分は $\triangle AQC$ だとわかる。 $\triangle ACB$ と $\triangle AQC$ の底辺をそれぞれ、AB、AQ とすると高さは等しいので、
 $\triangle ACB : \triangle AQC = AB : AQ = 11 : 5$

よって、 $\triangle AQC$ は $\triangle ACB$ の $\frac{5}{11}$ 倍である。

P. 49

9 < 解答例 >

- (1) 9 (2) $y = \frac{1}{2}x + 6$
 (3) ① 6 ② $3\sqrt{5}$

<考え方・解き方>

(1) $y = \frac{1}{4}x^2$ に $x = 6$ を代入して、

$$y = \frac{1}{4} \times 6^2$$

$$= 9$$

(2) $y = \frac{1}{4}x^2$ に $x = -4$ を代入して、

$$y = \frac{1}{4} \times (-4)^2 = 4$$

よって、直線 AB は $(-4, 4)$ 、 $(6, 9)$ を通ることがわかる。

(3) ①(2)より、 $y = \frac{1}{2}x + 6$ に $x = 2$ を代入して、

$$y = \frac{1}{2} \times 2 + 6 = 7$$

よって、 $P(2, 7)$

$y = \frac{1}{4}x^2$ に $x = 2$ を代入して、

$$y = \frac{1}{4} \times 2^2 = 1$$

よって、 $Q(2, 1)$

したがって 2 点 P、Q の距離は、

$$7 - 1 = 6$$

② $\angle ARQ = 90^\circ$ と

なるように、

$\triangle ARQ$ をつくる。

AR の長さは、

$$2 - (-4) = 6$$

RQ の長さは

$$4 - 1 = 3$$

三平方の定理より、

$$AQ^2 = 6^2 + 3^2$$

$$AQ^2 = 45$$

$$AQ = 3\sqrt{5}$$

$$y = \frac{1}{4} \times (-2)^2$$

$$= 1$$

よって、 $C(-2, 1)$

したがって、直線 BC は $B(4, 4)$ 、 $C(-2, 1)$ を通る直線だとわかる。

(3) ①点 P の x 座標を t とおく。

$\triangle OPC$ の底辺を直線 BC の切片、高さを点 P、点 C の x 座標の差と考えて、

$$\triangle OPC = 2 \times |t - (-2)| \times \frac{1}{2} = t + 2$$

次に、直線 AB の式 $y = x$ に $x = -2$ を代入して、

$$y = -2.$$

点 C の y 座標が 1 より、

$\triangle ABC$ の底辺をその y 座標の差、高さを点 A、

点 B の x 座標の差と考えて、

$$\triangle ABC = \{1 - (-2)\} \times \{4 - (-3)\} \times \frac{1}{2} = \frac{21}{2}$$

よって、 $\triangle OPC$ は $\triangle ABC$ の $\frac{1}{3}$ なので、

$$t + 2 = \frac{21}{2} \times \frac{1}{3}$$

$$t = \frac{3}{2}$$

点 P の y 座標は $y = \frac{1}{2}x + 2$ に $x = \frac{3}{2}$ を代入して、

$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{2} + 2 = \frac{11}{4}$$

したがって、 $P(\frac{3}{2}, \frac{11}{4})$ である。

②点 Q の y 座標は $y = -\frac{1}{3}x^2$ に $x = \frac{3}{2}$ を代入して、

$$y = -\frac{1}{3} \times (\frac{3}{2})^2 = -\frac{3}{4}$$

よって、 $Q(\frac{3}{2}, -\frac{3}{4})$

また、直線 AB の式 $y = x$ に $x = \frac{3}{2}$ を代入して、

$$y = \frac{3}{2}$$

その座標を R とすると、 $R(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$

である。
 $\triangle ABQ$ の底辺を RQ、高さを点 A、点 B の x 座標の差と考えて、

$$\triangle ABQ = \left| \frac{3}{2} - \left(-\frac{3}{4}\right) \right| \times \{4 - (-3)\} \times \frac{1}{2} = \frac{63}{8}$$

四角形 AQBC = $\triangle ABC + \triangle ABQ$

$$= \frac{21}{2} + \frac{63}{8} = \frac{147}{8}$$

$\triangle OPC$ は $\triangle ABC$ の $\frac{1}{3}$ なので、

$$\triangle OPC = \frac{21}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{7}{2}$$

よって、 $\frac{147}{8} \div \frac{7}{2} = \frac{21}{4}$ (倍)

P. 49

10 <解答例>

(1) $a = \frac{1}{4}$ (2) $y = \frac{1}{2}x + 2$

(3) ① $(\frac{3}{2}, \frac{11}{4})$ ② $\frac{21}{4}$ 倍

<考え方・解き方>

(1) $y = -\frac{1}{3}x^2$ に $y = -3$ を代入して、

$$-3 = -\frac{1}{3}x^2$$

$$x^2 = \pm 3$$

点 A は $x < 0$ なので、 $x = -3$

直線 AB は原点と $A(-3, -3)$ を通るので、

その式は $y = x$ だとわかる。

$y = x$ に $x = 4$ を代入して、

$$y = 4$$

つまり B の座標は $(4, 4)$ である。これを

$y = ax^2$ に代入して、

$$4 = 16a$$

$$a = \frac{1}{4}$$

(2) (1)より、 $y = \frac{1}{4}x^2$ に $x = -2$ を代入して、

P. 50

11 <解答例>

- (1) 12 (2) $a = \frac{1}{2}$
 (3) $y = -\frac{1}{2}x + 6$ (4) $(-\frac{4}{3}, \frac{20}{3})$

<考え方・解き方>

- (1) $y = -x + 12$ に $y = 0$ を代入して, $x = 12$
 (2) $y = -x + 12$ に $x = 4$ を代入して, $y = 8$
 よって, $A(4, 8)$ 。これを $y = ax^2$ に代入して,
 $8 = 16a$
 $a = \frac{1}{2}$
 (3) 点 B は点 A と y 軸について対称な点なので,
 $B(-4, 8)$
 $B(-4, 8)$, $C(12, 0)$ より, 傾きは,
 $\frac{0-8}{12-(-4)} = -\frac{1}{2}$
 求める式を $y = -\frac{1}{2}x + b$ とおき, $(12, 0)$ を代入して,
 $b = 6$
 したがって, $y = -\frac{1}{2}x + 6$
 (4) $\triangle CDO$ の面積は,
 $12 \times 12 \times \frac{1}{2} = 72$
 $\triangle POC + \triangle PCD = 80$ になるときのなので,
 $\triangle CDO < (\triangle POC + \triangle PCD)$
 つまり, 点 P は $x < 0$ の範囲になければならないので, 下図のようになる。

$\triangle PDO$ の高さを h とおく。 $\triangle PDO$ の面積を h を使って表すと,

$$12 \times h \times \frac{1}{2} = 6h$$

$\triangle POC + \triangle PCD = \triangle CDO + \triangle PDO = 80$ であればよいので,

$$72 + 6h = 80$$

これを解いて, $h = \frac{4}{3}$

よって, 点 P の x 座標は $-\frac{4}{3}$, これを $y = -\frac{1}{2}x + 6$

に代入して, $y = \frac{20}{3}$

したがって, $P(-\frac{4}{3}, \frac{20}{3})$

P. 50

12 <解答例>

- (1) $y = \frac{1}{4}x + 3$ (2) ア(8, 8) イ(4, 4)
 (3) $(\frac{28}{5}, \frac{22}{5})$

<考え方・解き方>

- (1) $y = \frac{1}{8}x^2$ に $x = -4$ を代入して, $A(-4, 2)$
 $y = \frac{1}{8}x^2$ に $x = 6$ を代入して, $B(6, \frac{9}{2})$
 $A(-4, 2)$, $B(6, \frac{9}{2})$ を通る直線なので,
 $y = \frac{1}{4}x + 3$
 (2) 点 C の x 座標を m とする。これを $y = \frac{1}{8}x^2$ に代入して, $C(m, \frac{1}{8}m^2)$
 四角形 ODCE は正方形なので, $OD = OE$ より,
 $m = \frac{1}{8}m^2$
 これを解いて,
 $m = 0, 8$
 $m > 0$ より, $m = 8$ 。よって, $C(8, 8)$ …ア
 正方形の面積を二等分するには, 二等分線が対角線の交点(中点)を通ればよい。
 対角線の交点(中点)を M とする。
 $C(8, 8)$, $O(0, 0)$ より, M の座標は,
 $(\frac{8+0}{2}, \frac{8+0}{2}) = (4, 4)$ …イ
 ここで, $y = \frac{1}{4}x + 3$ に $(4, 4)$ を代入すると,
 $4 = 4$
 等式が成り立つので, $y = \frac{1}{4}x + 3$ は $M(4, 4)$ を通ることがわかる。
 (3) 点 P の x 座標を t とおく。これを $y = \frac{1}{4}x + 3$ に代入して, $P(t, \frac{1}{4}t + 3)$
 $\triangle PCE = 8 \times \left\{ 8 - \left(\frac{1}{4}t + 3 \right) \right\} \times \frac{1}{2} = 20 - t$ …①

直線 AB と y 軸との交点を F とおくと、

$$\triangle OPA = \triangle OFA + \triangle OFP$$

$$= 3 \times 4 \times \frac{1}{2} + 3 \times t \times \frac{1}{2}$$

$$= 6 + \frac{3}{2}t \cdots \textcircled{2}$$

①、②より、

$$20 - t = 6 + \frac{3}{2}t$$

これを解いて、

$$t = \frac{28}{5}$$

点 P の y 座標は、 $\frac{1}{4} \times \frac{28}{5} + 3 = \frac{22}{5}$

よって、 $(\frac{28}{5}, \frac{22}{5})$

P. 51

13 <解答例>

(1) 1 (2) (4, 4) (3) $y = \frac{1}{2}x + 2$

(4) $(\frac{4}{3}, \frac{8}{3})$

<考え方・解き方>

(1) $y = \frac{1}{4}x^2$ に $x = -2$ を代入。 $y = \frac{1}{4} \times (-2)^2 = 1$ 。よって、点 A の y 座標は 1 となる。

(2) 点 B の y 座標は、点 A の y 座標より、3 だけ大きいので 4 となる。

よって、 $y = \frac{1}{4}x^2$ に $y = 4$ を代入して、

$$4 = \frac{1}{4}x^2$$

$$x^2 = 16$$

$$x = \pm 4$$

$$x > 0 \text{ より、}$$

$$x = 4$$

したがって、点 B の座標は、(4, 4) となる。

(3) A(-2, 1), B(4, 4) を通る直線の式を求める。

(4) 点 P の x 座標を t とすると、

$$P(t, \frac{1}{2}t + 2), Q(t, \frac{1}{4}t^2), R(t, 0) \text{ となる。}$$

$$\text{よって、} PQ = (\frac{1}{2}t + 2) - (\frac{1}{4}t^2) = \frac{1}{2}t + 2 - \frac{1}{4}t^2$$

$$QR = (\frac{1}{4}t^2) - (0) = \frac{1}{4}t^2$$

ここで、 $PQ : QR = 5 : 1$ より、

$$\frac{1}{2}t + 2 - \frac{1}{4}t^2 : \frac{1}{4}t^2 = 5 : 1$$

$$3t^2 - t - 4 = 0$$

$$t = -1, \frac{4}{3}$$

$t > 0$ なので、

$$t = \frac{4}{3}$$

したがって、点 P の座標は $(\frac{4}{3}, \frac{8}{3})$ となる。

P. 51

14 <解答例>

(1) $a = \frac{3}{4}$ (2) $y = \frac{3}{2}x + 6$

(3) ① $\frac{3}{2}$ ② 9 倍

<考え方・解き方>

(1) A の y 座標が 3 より、①の $y = -x + 1$ に $y = 3$ を代入すると、 $3 = -x + 1$ 、よって、 $x = -2$ 。よって、点 A の x 座標は -2 となる。 $x = -2$, $y = 3$ を ⑦の $y = ax^2$ に代入して、 $3 = a \times (-2)^2$ より、 $a = \frac{3}{4}$ となる。

(2) A(-2, 3), C(4, 12) を通る直線の式を求める。

(3) ① 点 P の x 座標を t とすると、

$$P(t, \frac{3}{4}t^2), Q(t, \frac{3}{2}t + 6), R(t, -t + 1) \text{ となる。}$$

$$\text{よって、} PQ = (\frac{3}{2}t + 6) - (\frac{3}{4}t^2) = \frac{3}{2}t + 6 - \frac{3}{4}t^2 \cdots \textcircled{1}$$

$$PR = (\frac{3}{4}t^2) - (-t + 1) = \frac{3}{4}t^2 + t - 1 \cdots \textcircled{2}$$

ここで、 $PQ : PR = 3 : 1$ と ①、② より、

$$\frac{3}{2}t + 6 - \frac{3}{4}t^2 : \frac{3}{4}t^2 + t - 1 = 3 : 1$$

$$2t^2 + t - 6 = 0$$

$$t = -2, \frac{3}{2}$$

$$\frac{2}{3} < t < 4 \text{ なので、}$$

$$t = \frac{3}{2}$$

したがって、点 P の x 座標は $\frac{3}{2}$ となる。

② ① より、 $P(\frac{3}{2}, \frac{27}{16}), Q(\frac{3}{2}, \frac{33}{4}), R(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2})$ となる。

条件より、 $PQ : PR = 3 : 1$ 。

$$\text{また、} AB : BR = \frac{8}{3} : \frac{3}{2} - \frac{2}{3} = 16 : 5,$$

$$AQ : QC = \frac{3}{2} - (-2) : 4 - \frac{3}{2} = 7 : 5 \text{ となる。}$$

ここで、 $\triangle ABP = 16a$ とすると、 $\triangle APR = 21a$ となり、 $\triangle AQR = 84a$ と表せる。さらに、 $\triangle ARC = 84a \times \frac{12}{7} = 144a$ と表せるので、 $144a \div 16a = 9$ (倍) となる。

15 <解答例>

(1) 8 (2) 4 (3) $y = -\frac{1}{2}x + 4$

(4) $(\frac{8}{3}, -\frac{8}{3})$

<考え方・解き方>

(1) $y = \frac{1}{8}x^2$ に $x = -8$ を代入して, $y = \frac{1}{8} \times (-8)^2 = 8$.

よって, 点 A の y 座標は 8 となる。

(2) $y = \frac{1}{8}x^2$ に $y = 2$ を代入して,

$$2 = \frac{1}{8}x^2$$

$$x^2 = 16$$

$$x = \pm 4$$

$$x > 0 \text{ より,}$$

$$x = 4$$

したがって, 点 B の x 座標は 4 となる。

(3) A(-8, 8), B(4, 2) を通る直線の式を求める。

(4) $\triangle PAB = \triangle OAC$ より, 重なっている部分の $\triangle OAB$ をのぞいて, 次の図のように $\triangle OBP = \triangle OBC$ となる。よって, $OB \parallel PC$ となればよい。

直線 OB の式は $y = ax$ に B(4, 2) を代入して,

$$y = \frac{1}{2}x$$

直線 AB の式に C の $y = 0$ を代入して,

$$0 = -\frac{1}{2}x + 4$$

$$x = 8$$

したがって, C(8, 0) となる。

$OB \parallel PC$ より, 直線 PC の式を $y = \frac{1}{2}x + b$ とおき,

C(8, 0) を代入して,

$$0 = \frac{1}{2} \times 8 + b$$

$$b = -4$$

よって, $y = \frac{1}{2}x - 4$

直線 OA の式は $y = ax$ に A(-8, 8) を代入して,

$$y = -x$$

点 P の座標は, 直線 PC と直線 OA の交点なので,

$$\begin{cases} y = \frac{1}{2}x - 4 \\ y = -x \end{cases}$$

これを解くと,

$$x = \frac{8}{3}, y = -\frac{8}{3}$$

したがって, 点 P の座標は $(\frac{8}{3}, -\frac{8}{3})$ となる。

16 <解答例>

(1) $a = \frac{1}{4}$ (2) $y = 4x - 12$

(3) ① $\frac{1}{2}t + 2$ ② $t = \frac{4}{3}, 2$

<考え方・解き方>

(1) $y = ax^2$ に A(4, 4) を代入して,

$$4 = a \times 4^2$$

$$a = \frac{1}{4}$$

(2) B の x 座標が -2 より, C の x 座標が 2 とわかる。

① の $y = -x^2$ に $x = 2$ を代入すると,

$$y = -2^2 = -4$$

よって, C(2, -4) となる。

したがって,

A(4, 4), C(2, -4) を通る直線の式を求める。

(3) 下図参照。

① $QA = QP$ より, 点 Q の x 座標は, 点 P と点 A の x 座標の midpoint となる。

P(t, 4), A(4, 4) より,

点 Q の x 座標は, $\frac{t+4}{2} = \frac{1}{2}t + 2$ となる。

② 直線 AC の $y = 4x - 12$ に $x = \frac{1}{2}t + 2$ を代入して,

$$y = 4(\frac{1}{2}t + 2) - 12$$

$$y = 2t - 4$$

よって, $Q(\frac{1}{2}t + 2, 2t - 4)$ となる。

$\triangle QHD = \triangle PHQ \times 3$ より,

$$\frac{1}{2} \times 8 \times (\frac{1}{2}t + 2) = \frac{1}{2} \times t \times \{4 - (2t - 4)\} \times 3$$

$$3t^2 - 10t + 8 = 0$$

$$t = \frac{4}{3}, 2 \text{ となる。}$$

P. 53

17 <解答例>

(1) $a = 2$ (2) 2
 (3) $y = 2x + 4$ (4) $(\frac{3}{4}, \frac{11}{2})$

<考え方・解き方>

- (1) $y = ax^2$ に $A(-1, 2)$ を代入して、
 $2 = a \times (-1)^2$
 $a = 2$
- (2) ①より、①の関数は、 $y = 2x^2$ と表すことができる。
 $y = 8$ を代入して、
 $8 = 2x^2$
 $x^2 = 4$
 $x = \pm 2$
 $x > 0$ より、
 $x = 2$
 したがって、点Bの x 座標は 2 となる。
- (3) $A(-1, 2)$ 、 $B(2, 8)$ を通る直線の式を求める。
- (4) $\triangle OPC = \triangle AOB \times \frac{1}{4}$ より、

$AB : CP = 4 : 1$ となる。
 よって、平行線と線分の比の関係から、
 Pの x 座標は、

$$x = \{2 - (-1)\} \times \frac{1}{4}$$

$$= 3 \times \frac{1}{4}$$

$$= \frac{3}{4}$$

直線ABの式に $x = \frac{3}{4}$ を代入して、

$$y = 2 \times \frac{3}{4} + 4$$

$$= \frac{11}{2}$$

したがって、点Pの座標は $(\frac{3}{4}, \frac{11}{2})$ となる。

P. 53

18 <解答例>

(1) $a = \frac{1}{2}$ (2) $y = \frac{6}{5}x + \frac{16}{5}$
 (3) ① $\frac{4}{3}$ ② $(-\frac{2}{3}, \frac{12}{5})$

<考え方・解き方>

- (1) $y = 2x^2$ に $x = 1$ を代入して、
 $y = 2 \times 1^2$
 $y = 2$
 よって、 $A(1, 2)$ となる。
 直線OAの式は、 $y = ax$ に $A(1, 2)$ を代入して、
 $y = 2x$
 直線OAの式に $x = 4$ を代入して、
 $y = 2 \times 4$

$y = 8$
 よって、 $B(4, 8)$ となる。
 $y = ax^2$ に $B(4, 8)$ を代入して、
 $8 = a \times 4^2$
 $a = \frac{1}{2}$

- (2) $y = 2x^2$ に $x = -1$ を代入して、
 $y = 2 \times (-1)^2$
 $y = 2$
 よって、 $C(-1, 2)$ となる。
 したがって、
 $B(4, 8)$ 、 $C(-1, 2)$ を通る直線の式を求める。
- (3) ①点Pの x 座標を t とすると、

$P(t, \frac{1}{2}t^2)$ 、 $Q(t, 0)$ 、 $R(t, 2t^2)$ となる。

よって、 $PR = 2t^2 - \frac{1}{2}t^2 = \frac{3}{2}t^2$

$QD = 4 - t$

ここで、 $PR = QD$ より、

$$\frac{3}{2}t^2 = 4 - t$$

$$3t^2 + 2t - 8 = 0$$

$$t = -2, \frac{4}{3}$$

$0 < t < 4$ なので、

$$t = \frac{4}{3}$$

したがって、点Pの x 座標は、 $\frac{4}{3}$ となる。

② $\triangle SPR = \triangle SQD \times \frac{5}{6}$ より、

$\triangle SPR : \triangle SQD = 5 : 6$

それぞれの三角形の底辺を PR 、 QD と考えると、
 $PR = QD$ より、高さの比が $5 : 6$ となればよい。
 ここで、点Sの x 座標を m とすると、

直線BCの $y = \frac{6}{5}x + \frac{16}{5}$ に $x = m$ を代入して、

$$y = \frac{6}{5}m + \frac{16}{5}$$

よって、 $S(m, \frac{6}{5}m + \frac{16}{5})$ となる。

高さの比が $5 : 6$ より、

$$(\frac{4}{3} - m) : (\frac{6}{5}m + \frac{16}{5}) = 5 : 6$$

$$m = -\frac{2}{3}$$

点Sの y 座標は、 $\frac{6}{5}m + \frac{16}{5}$ に、 $m = -\frac{2}{3}$ を代入して、

$$\frac{6}{5} \times (-\frac{2}{3}) + \frac{16}{5} = \frac{12}{5}$$

したがって、点Sの座標は、 $(-\frac{2}{3}, \frac{12}{5})$ となる。

P. 54

19 <解答例>

(1) 4 (2) -6

(3) $y = -\frac{1}{2}x + 6$ (4) $(3, \frac{9}{4})$

<考え方・解き方>

(1) $y = \frac{1}{4}x^2$ に $x=4$ を代入して,

$$y = \frac{1}{4} \times 4^2 = 4$$

したがって、点Aの y 座標は4となる。

(2) $y = \frac{1}{4}x^2$ に $y=9$ を代入して,

$$9 = \frac{1}{4} \times x^2$$

$$x^2 = 36$$

$$x < 0 \text{ より,}$$

$$x = -6$$

したがって、点Bの x 座標は-6となる。

(3) A(4, 4), B(-6, 9)を通る直線の式を求める。

(4) 点Pの x 座標を t とすると,

$$P(t, \frac{1}{4}t^2), Q(t, -\frac{1}{2}t+6), R(t, 0) \text{ となる。}$$

よって,

$$QP = -\frac{1}{2}t + 6 - \frac{1}{4}t^2$$

$$PR = \frac{1}{4}t^2$$

ここで、 $QP=PR$ より,

$$-\frac{1}{2}t + 6 - \frac{1}{4}t^2 = \frac{1}{4}t^2$$

$$t^2 + t - 12 = 0$$

$$t = -4, 3$$

$$t > 0 \text{ より, } t = 3$$

したがって、点Pの座標は $(3, \frac{9}{4})$ となる。

P. 54

20 <解答例>

(1) $a = \frac{1}{4}$ (2) $y = \frac{4}{3}x + \frac{16}{3}$

(3) ① $-\frac{3}{2}t^2 + 8t + 32$ ② $t = 2 + 2\sqrt{5}$

<考え方・解き方>

(1) $y = \frac{1}{2}x + 2$ に $x=4$ を代入して,

$$y = \frac{1}{2} \times 4 + 2$$

$$y = 4$$

よって、A(4, 4)。これを $y = ax^2$ に代入して,

$$4 = a \times 4^2$$

$$a = \frac{1}{4}$$

(2) $y = \frac{1}{4}x^2$ に $x=8$ を代入して,

$$y = \frac{1}{4} \times 8^2$$

$$y = 16$$

よって、B(8, 16)となる。

また、 $y = \frac{1}{2}x + 2$ に $y=0$ を代入して,

$$0 = \frac{1}{2}x + 2$$

$$x = -4$$

よって、C(-4, 0)。

したがって、B(8, 16), C(-4, 0)を通る直線の式を求める。

(3) ① $y = \frac{1}{4}x^2$ に $x=t$ を代入して、 $y = \frac{1}{4}t^2$ より,

$$P(t, \frac{1}{4}t^2) \text{ となる。}$$

ここで、直線BC上に点Pと同じ x 座標をもつ点

Qをとる。 $y = \frac{4}{3}x + \frac{16}{3}$ に $x=t$ を代入して,

$$y = \frac{4}{3}t + \frac{16}{3} \text{ より, } Q(t, \frac{4}{3}t + \frac{16}{3}) \text{ となる。}$$

よって、 $\triangle BCP = \triangle BPQ + \triangle CPQ$ より,

$$\triangle BCP = \frac{1}{2} \times (\frac{4}{3}t + \frac{16}{3} - \frac{1}{4}t^2) \times (8 - t) + \frac{1}{2} \times (\frac{4}{3}t$$

$$+ \frac{16}{3} - \frac{1}{4}t^2) \times \{t - (-4)\}$$

$$= -\frac{3}{2}t^2 + 8t + 32 \text{ となる。}$$

$$\textcircled{2} \triangle PCD = \frac{1}{2} \times \{8 - (-4)\} \times \frac{1}{4}t^2$$

$$= \frac{3}{2}t^2$$

$$\triangle BCP = \frac{1}{3} \times \triangle PCD \text{ より,}$$

$$-\frac{3}{2}t^2 + 8t + 32 = \frac{1}{3} \times \frac{3}{2}t^2$$

$$4 \leq t \leq 8 \text{ より,}$$

$$t = 2 + 2\sqrt{5} \text{ となる。}$$